


Kreslil	Vypracoval	Zodp. projektant	 GEOVAP GEOVAP s r.o. Čechovo nábřeží 1790, 530 03 Pardubice	
Ing. M. Janovská	Ing. M. Janovská	Ing. Jiří Filip		
Kraj: Středočeský		Obec: Břežany II		
Zadavatel: SPÚ, Pobočka Kolín, Karlovo náměstí 45, 28002			Stupeň	DPS
Akce: Realizace LBK 7/13-13-18 v k.ú. Břežany II			Datum	10/2020
			Formát	A4
			Zak. číslo	
Obsah: Technická zpráva			Měřítko	Čís.přílohy D.1

OBSAH:

<u>1. Současný stav území</u>	<u>Str. 1</u>
<u>2. Přípravné práce</u>	<u>Str. 1</u>
<u>3. Terénní úpravy</u>	<u>Str. 2</u>
<u>4. Vegetační úpravy</u>	<u>Str. 2</u>
<u>5. Následná péče</u>	<u>Str. 7</u>
<u>6. Pěstební péče</u>	<u>Str. 8</u>

1. Současný stav území

Zájmové území se nachází ve Středočeském kraji, v okrese Kolín, v katastru Břežany II, na pozemcích ve vlastnictví Obce Břežany II.

Pozemky vymezené pro projektovaný lokální biokoridor LBK 7/13-13-18 byly navrženy v rámci schválené komplexní pozemkové úpravy, která nahrazuje územní rozhodnutí pro umístění staveb Plánu společných zařízení. Pozemky vymezené pro biokoridor splňují požadavek na min. šíři 15,0 m pro lokální biokoridor lesního typu. PD řeší pouze část biokoridoru, nacházející se v k.ú. Břežany II, v úseku podél odvodňovacího příkopu PK1 a podél Týnického potoka. Biokoridor je vzhledem k charakteru navazujících napojovaných částí LBK navržen jako smíšený - lesní s lučními enklávami (vychází z prostorových omezení - OP sítí). V části vedené v trase příkopu PK1 je navržen zároveň jako poloprodouvací větrolam k ochraně orné půdy i intravilánu před větrnou erozí. Biokoridor zasahuje do STG 2 B 3 (typické bukové doubravy). Přírodní podmínky jsou blíže popsány v příloze B.

Pozemky biokoridoru jsou v současném stavu zorněny. Odvodňovací příkop PK1 (délka 510 m) je podmiňující investicí pro realizaci navrženého LBK. Příkop řeší samostatná PD (GEOVAP s.r.o., 2020).

Stávající vegetaci představuje sporadický břehový porost Týnického potoka. Kácení stáv. dřevin se nenavrhuje.

Přístup ke staveništi je zajištěn po polních cestách a stáv. silniční síť z obce Břežany II.

Následuje chronologicky sestavený popis pracovních bloků.

2. Přípravné práce

Vytyčení dotčených pozemků bude zajištěno v dostatečném předstihu před realizací, aby bylo možno pozemky uvolnit z obhospodařování (obvykle ke 30.IX.). Ke stabilizaci hranic budou použity plastové mezníky.

Tab. 1: Materiál pro geodetické práce

č. stav. objektu	mezník plastový [ks]	mezník kamenný [ks]	akát. ohradní kůly [ks]
--	80	0	0
CELKEM	80	0	0

Vytyčení inženýrských sítí - bude provedeno na základě vyjádření správců sítí, před zahájením stavebních prací (podklady viz příloha E).

Pozemky budou z obhospodařování uvolněny k datu 30.9. Plochy orné půdy budou **zorány a sesmykovány** (alt. zavláčeny branami).

V rámci přípravy bude na p.p.č. 1334 na stávající vzrostlé třešni ptačí (viz výkr. C.2.2) **proveden odborný řez**: zbavit keřového obrostu v patě kmene (10 m²), vyvětvení na podjezdnou výšku, zdravotní řez a průklest koruny.

3. Terénní úpravy

Nenavrhují se (stavbu příkopu PK1 na p.p.č. 1225 řeší samostatná PD).

4. Vegetační úpravy

Zřízení oplocenek musí předcházet veškerým výsadbám dřevin. Oplocenky budou zřízeny z akátových nebo dubových prořezávkových kůlů (v. 2,2 m, š. min. 10 cm), ve spodní části opálených, rozmístěných po 3 metrech do vrtaných jam hl. 0,6 m. Zpevnění kůlů proti vyvrácení vzpěrami bude zřízeno u každého třetího kůlu a všech rohových kůlů. Každý šestý kůl bude zvýšený o 50 cm (celk. dl. tedy 2,7 m) a svrchu bude přišroubován (vrut min. 150 mm) 30 cm dl. příčník jakožto posed pro dravce. Kůly budou osazeny lesnickým uzlíkovým pletivem 2,0/1,6/23 drátů Zn, výšky 1,6 m (upevnění na kůl min. osmi skobami), se spodními zúženými oky. Dolní okraj pletiva bude uprostřed pole přichycen k terénu (200 mm skoba „U“ rox. pr. 6 mm). V každé oplocence budou zřízeny vždy 2 branky na opačných stranách pro přístup údržby. Při dokončování oplocenek bude součástí dodávky zajištění vyhnání zvěře, popřípadě zvířat, která mohou způsobit škodu na ochraňovaných výsadbách, ven z oplocenky. Oplocenka je pěstební opatření a nepovažuje se za oplocení lesních a zemědělských kultur ve smyslu stavebního zákona. Životnost je předpokládána minimálně 5 let (pokud bude funkční, je vhodné ponechat co nejdéle).

Alejoové stromy, situované mimo souvislé porosty, budou ochráněny individuální mechanickou chráničkou v. 1,2 m. Umístění oplocenek je zakresleno ve výkresech C.2.

Tab.2: Parametry oplocenek a rozdělení sadebního materiálu

označení úseku - oplocenky	rozloha úseku [m ²]	délka oplocení [m]	počet nosných kůlů [ks]	počet příčníků - posedů	stromy [ks]	keře [ks]
SEG. "A"	276	147	49	8	34	123
SEG. "B"	75	56	19	3	12	35
SEG. "C"	212	99	33	6	67	29
SEG. "D"	630	148	49	8	315	0
SEG. "E"	913	385	128	21	210	300
SEG. "F"	450	307	102	17	49	247
SEG. "G"	135	96	32	5	14	72
SEG. "H"	88	52	17	3	20	30
SEG. "I"	250	110	37	6	45	103
SEG. "J"	1100	206	69	11	524	60
CELKEM	4129	1606	535	89	1290	999

Výsadby dřevin. Výsadby budou prováděny v chladném a vlhkém podzimním období od poloviny září do zámru (cca poč. prosince). Výsadba bude rozfázována v závislosti na velikosti (choulostivosti) sadebního materiálu. Vytyčení výsadeb soliter a rohů oplocenek bude provedeno protínáním z délek z vytyčených bodů hranice pozemku, vytyčení v oplocenkách bude provedeno ortogonálně (do vybudovaných oplocenek budou v rozestupech umístěny osy výsadeb – provázky – dle schémat výsadby C.2, viz detail, odstup výsadby od hranice oplocenky je počítán 1,0 m).

Bezprostředně před vysazením bude kořenový systém buků, dubů, jeřábů, lip, habrů máčen v mykorhizním roztoku Symbiom ECTOVIT (zajistí vyrovnaný růst stromů a lepší

čerpání živin kořeny, vyšší odolnost vůči suchu, sníží stres po přesazení, sníží potřebu závlivky a hnojení a urychlí vytvoření lesního ekosystému i v rámci pedonu - zvýší vsakování). Kořenový systém javorů, jabloní, hrušní, třešní bude máčen v mykorhizním roztoku Symbiom SYMBIVIT. Dávkování je propočteno dle pokynů výrobce pro mokrou aplikaci (SYMBIVIT 37,5 g/rostlina, ECTOVIT 15 g/rostlina).

V první řadě budou vysázeny solitérní alejové stromy, dle výkresu C.2. Všechny alejové stromy (obv. km. 8-10 cm, se zapěstovanou korunou min. v. 1,8 m) budou vysazeny do kopaných jam odpovídajících kořenovému balu - 0,125 m³ (minimálně 1,5 násobek průměru kořenového balu). Do výsadbové jámy vysokokmenů bude přidán hydrogel (PLANTASORB a.j.) v dávce 180 g/strom. Hydrogel bude v jamce pravidelně rozprostřen, aby nedocházelo k deformacím a nerovnoměrnému zásobení kořenového systému, případně k vytlačování sazenic z půdy! Stromy budou ukotveny třemi frézovanými kůly (prům. min. 8 cm, dl. 250 cm) s příčníky, kůly budou zapuštěny min. 15 cm hluboko do nezkyplené půdy v jamce před zasypáním. Instalována bude individuální plastová chránička proti okusu zvěří – pletivo Polynet v. 120 cm (0,5 m dl./1 ks). Stromek i chránička budou ke kůlu upevněny dvěma úvazky textilním páskem (cca 100 cm/strom). Na závěr bude vytvořena vsakovací mísa, bude provedeno mulčování (0,5 m²/sazenice) v tl. 8-12 cm (po slehnutí, přičemž mulč nesmí zasahovat až ke kořenovému krčku) a bude provedena závlivka (100 l/jed.). Po výsadbě bude proveden redukční řez koruny vysazených stromů s ponecháním terminálního výhonu.

Následně budou do oplocenek vysázeny sazenice okrasných dřevin (prostokořenné poloodrostky, 2x podřezávaný koř. systém, o výšce nadz. části 51-70 cm) a keře (krytokořenné sazenice vícevýhonové o výšce 60-80 cm), tvořící hlavní objem výsadeb. Budou sázeny v liniích ve sponu dle osazovacích schémat, resp. popisu v situačním výkresu, do jamek pr. 0,15 m, hl. 0,50 m (0,01 m³). Jamka bude odpovídat kořenovému systému - ohýbání a deformování kořenů je naprosto nepřijatelné (dlouhé kořeny lze výjimečně zastříhnout)! Stěna jamky nesmí mít hladké stěny, bránící prorůstání kořenů! Do výsadbové jamky stromů bude přidán hydrogel (PLANTASORB a.j.) v dávce 20 g/sazenice. Hydrogel bude v jamce pravidelně rozprostřen, aby nedocházelo k deformacím a nerovnoměrnému zásobení kořenového systému, případně k vytlačování sazenic z půdy! Provedeno bude mulčování souvislých pásů výsadeb (0,5 m²/sazenice) slaměným mulčem v tl. 8-12 cm (po slehnutí). Veškeré sazenice budou opatřeny ochranným nátěrem repelentu Aversol (5 kg/1000 sazenic). Bude provedena závlivka 20 l/jed.

Bezprostředně po výsadbě lze velmi doporučit osazení signálních kolíků s výrazně natřenou hlavou v liniích jednotlivých výsadbových řad, nejméně na vzdálenost přímé viditelnosti, což realizační firmě usnadní a zlevní následnou péči (ožínání při vzrostlé buřeni) a sníží případné ztráty sazenic, které budou muset být v rámci záruky a předání díla bez vad a nedodělků nahrazeny.

Sadební materiál je z důvodu regionálního původu sad. materiálu doporučeno odebírat v některé z regionálních lesních školek v oblasti (PLO 17), např. Školní lesní podnik ČZU, V Lánech 214, 281 66 Jevany; Arnika, Lesní a okrasné školky, Komenského ul., 253 01 Hostivice; Arboeko s.r.o., 277 42 Obříství 230; Školky - Montano, spol. s r.o., Přerov nad Labem 410, 289 16; LESOŠKOLKY s.r.o., 1. máje 104, 533 13 Řečany nad Labem aj. Sadební materiál musí svou kvalitou odpovídat ČSN 48 2115 a ČSN 46 4902. V rámci aut. dozoru budou kontrolovány listy o pův. sad. materiálu!

Tab. 3: Shrnutí počtů a velikostí sadebního materiálu

český název	vědecký název	keře vel. 60-80 cm KK	polo- odrostky vel. 51-70 cm PK	--	vyskoko- kmeny vel. 8-10 cm KK	CELKEM
OKRASNÉ STROMY						
buk lesní	(<i>Fagus sylvatica</i>)		176			176
bříza bělokorá	(<i>Betula pendula</i>)		107			107
dub letní	(<i>Quercus robur</i>)		330		9	339
dub zimní	(<i>Quercus petraea</i>)		208		6	214
habr obecný	(<i>Carpinus betulus</i>)		106		2	108
hrušeň polníčka	(<i>Pyrus pyraeaster</i>)		31			31
jablono lesní	(<i>Malus sylvestris</i>)		22			22
jeřáb ptačí	(<i>Sorbus aucuparia</i>)		59			59
jeřáb břek	(<i>Sorbus torminalis</i>)		33			33
javor babyka	(<i>Acer campestre</i>)		40		8	48
jasan ztepilý	(<i>Fraxinus excelsior</i>)		33		3	36
lípa srdčitá	(<i>Tilia cordata</i>)		33		4	37
lípa velkolistá	(<i>Tilia platyphyllos</i>)		20			20
olše lepkavá	(<i>Alnus glutinosa</i>)		28		6	34
topol černý	(<i>Populus nigra</i>)		22		9	31
topol osika	(<i>Populus tremula</i>)				6	6
třešeň ptačí	(<i>Cerasus avium</i>)		42			42
Okras. stromy celkem			1290		53	1343
OVOCNÉ STROMY						
hrušeň obecná "Clappova"	(<i>Pyrus communis</i>)				1	1
hrušeň obecná "Chameuska"	(<i>Pyrus communis</i>)				1	1
jeřáb oskeruše	(<i>Sorbus domestica</i>)				1	1
třešeň ptačí "Burlat"	(<i>Cerasus avium</i>)				4	4
třešeň ptačí "Karešova"	(<i>Cerasus avium</i>)				4	4
třešeň ptačí "Kaštánka" alt. "Van"	(<i>Cerasus avium</i>)				2	2
Ovoc. stromy celkem					13	13

český název	vědecký název	keře vel. 60-80 cm KK	polo- odrostky vel. 51-70 cm PK	--	vyskoko- kmeny vel. 8-10 cm KK	CELKEM
OKRASNÉ KEŘE						
dřín obecný	<i>(Cornus mas)</i>	61				61
hloh jednobložný	<i>(Crataegus monogyna)</i>	198				198
kalina obecná	<i>(Viburnum opulus)</i>	102				102
líška obecná	<i>(Corylus avellana)</i>	189				189
ptačí zob obecný	<i>(Ligustrum vulgare)</i>	79				79
růže šípková	<i>(Rosa canina)</i>	72				72
svída krvavá	<i>(Swida sanguinea)</i>	90				90
zimolez pýřitý	<i>(Lonicera xylosteum)</i>	209				209
Okras. keře celkem		999				999
Sadební mat. celkem		<u>999</u>	<u>1290</u>	<u>0</u>	<u>66</u>	<u>2355</u>

* *KK* – krytokořenný sadební materiál

* *PK* – prostokořenný sadební materiál

Založení travních porostů. Po dokončení výsadeb dřevin bude provedeno celoplošné založení travních porostů včetně oplocenek.

Celková plocha k založení travních porostů zaujímá 8031 m².

Bude využita směs **KLASIK** - květnatá louka klasická (např. z produkce Agrostis Rousínov, trávy 90%, min. podíl bylin 10%). Výsev dle doporučení výrobce činí 80 kg*ha⁻¹.

V období 6-8 týdnů po výsevu bude provedena první **odplevelovací seč**, další dle potřeby na výšku strniště cca 60 mm.

5. Následná péče

Následná péče bude součástí dodávky zhotovitele. Skládá se z následujících pracovních bloků:

Kontrola ochrany proti okusu a zdravotního stavu výsadeb, oprava úvazků. Dvakrát ročně (na jaře a na podzim) bude kontrolována neporušenost chrániček a oplocenek, s okamžitou opravou závad. Zároveň budou kontrolovány a uvolňovány úvazky, aby nedocházelo ke škrcení odrůstajících kmínků. Opakován bude ochranný nátěr repelentu Aversol (5 kg/1000 sazenic, 2x – na jaře a na podzim). Sledován bude též zdravotní stav výsadeb, v případě zhoršení budou bez prodlení provedena nápravná opatření (zálivka, dodatečné zamulčování, aplikace pachového ohradníku v případě silného ataku zvěře, zejm. černé, redukční řez solitér k omezení plochy výparu, nátěr kmínků bílým vápnem proti mrazovým trhlinám aj. dle konkr. podmínek a po odsouhlasení s autorským dozorem).

Sečení travních porostů bude prováděno strojově (rotační či bubnovou sekačkou, mulčování není v biocentru vhodné) v meziřadí výsadeb a na volných travnatých plochách, celkem 12964 m². Sečení je nutné v prvním roce 3x ročně (při výšce plevelů cca 20 cm, na výšku seče min. 6 cm - pro zapěstování květnatého trávníku) později 2x ročně (konec června po vyhnízdění ptáků a počátek září). Posečená hmota bude přihrnuta jako mulč k sazenicím – není nutné kalkulovat odvoz a likvidaci biomasy.

Zálivka je nezbytná 3x ročně, předpokládaným obdobím je červenec a srpen, avšak provedení zálivky se vždy bude řídit aktuálním stavem počasí (dlouhodobý přísušek). Dávka bude obdobná výsadbové zálivce. Předpokládán je dovoz na vzdálenost max. 2 km (odběr vody z vodovodní sítě).

Doplnění úhynů. Předpoklad vylepšování je do 10 %. Uhynulé sazenice je nutné nahradit sadebním materiálem stejného druhu a vyšší vyspělosti (dosadby musí odpovídat velikosti okolního porostu). Dosadby zjištěné během roku budou prováděny zásadně v podzimním období.

Výchovné řезы solitérních stromů. Budou prováděny na výsadbách alejových stromů od 3. roku po výsadbě, zásadně v jarním období (III./IV.) po odeznění mrazů. Cílem je dopěstování koruny, zdravotní řez, eliminace nebezpečných větvení (vidlic), podpora rovnoměrného rozvoje a stability koruny směrem k habituálnímu optimu.

Doplnění mulče k výsadbám. Poslední rok následné péče bude provedeno mulčování v rozsahu a množství obdobnému výsadbě (0,5 m²/sazenice) slaměným mulčem v tl. 8-12 cm (po slehnutí).

Následnou péči lze považovat za ukončenou jedině po zajištění porostů (zejm. výška sazenic nad max. výšku buřeně, úhyn sazenic max. do 10 % bez výrazných souvislých ploch úhynu, a další dle zák. 289/1995 Sb.).

6. Pěstební péče

Pěstební péče plynule navazuje na řádně ukončenou etapu následné péče (počínaje 5. rokem po výsadbě). Pěstební péče je předpokládána v režii nabyvatele hotového díla – Obce Břežany II, vlastními prostředky, případně smluvně (místní MS apod.). Pěstební péči je nutno provádět za odborného dohledu arboristy, případně odborného lesního hospodáře.

Hlavní zásady pěstební péče lze shrnout do následujících bodů:

- pokud nedojde k rozšíření expanzivních či invazních druhů v podrostu (např. třtina křovištní), je možné natrvalo ukončit sečení v oplocenkách
- pěstební zásahy do lesního porostu je nutné rozložit vždy do více drobnějších zásahů v průběhu několika sezon, spíše než provedení jednoho masivního zásahu
- schematický zásah (například odstraňování určených řad nebo každého x-tého jedince) do dřevinného patra je nepřípustný
- v lesním porostu je nutná aplikace výběrného hospodářského způsobu, s pozitivním výběrem k docílení strukturního a věkového rozčlenění porostu
- pěstební zásahy do lesního porostu musí směřovat k zachování cílové druhové skladby (DB40, BK20, HB10, LP10, JV10, HR+, JB+, TŘ+) tak, jak vyplývá z prováděcího projektu
- ponechávání maximálního množství odumřelého dřeva nastojato i v podrostu je žádoucí pro ekologické funkce biocentra
- pro podporu drobných savců je vhodné ponechávat v porostech snosy větví, klestu apod.
- důsledné vyhledávání a eliminace invazních druhů dřevin (zejm. netýkavka žlaznatá - *Impatiens glandulifera*, křídlatka – *Reynoutria spp.*, trnovník akát - *Robinia pseudoacacia*, pajasan žlaznatý – *Ailanthus altissima*, javor jasanolistý - *Acer negundo*, dub červený – *Quercus rubra*)
- holosečné obnovní způsoby jsou zcela nepřípustné, v průběhu času je nutno postupně uvolňovat mladé jedince z přirozené obnovy
- po překročení životnosti oplocenek (cca max. 10 let) je nutno tyto odstranit, pletivo recyklovat
- keřové výsadby není nezbytně nutné řezem vychovávat
- luční partie biokoridoru, mimo porosty dřevin, je pro udržení bohaté druhové pestrosti vhodné alespoň občasně (1x za 2-3 roky) udržovat sečením (vždy dodržet termín nejdříve koncem června), případná pastva malých hosp. zvířat je rovněž žádoucí pro ekologické funkce biokoridoru